

LAMITOR®

Antiépileptique

Dans quel cas le médicament LAMITOR®

est-il prescrit ?

Ce médicament est un antiépileptique. Il inhibe la libération du glutamate dans le cerveau, une substance impliquée dans le déclenchement des crises d'épilepsie. Il a également un effet bénéfique chez les personnes souffrant d'un trouble bipolaire, mais son mécanisme d'action est mal connu.

Il est utilisé dans :

- le traitement de l'épilepsie, seul ou en complément des traitements classiques lorsque ceux-ci ne parviennent pas à prévenir la survenue des crises ;
- la prévention des épisodes dépressifs associés à un trouble bipolaire.

Présentations du médicament LAMITOR®

LAMITOR® 25 mg : comprimé; boîte de 60

LAMITOR® 50 mg : comprimé ; boîte de 40

LAMITOR® 5 mg : comprimé dispersible; boîte de 30

Composition du médicament LAMITOR®

	p cp	p cp	p cp
Lamotrigine	25 mg	50 mg	5 mg

Contre-indications du médicament LAMITOR®

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- enfant de moins de 2 ans (en l'absence d'études),
- en association avec le millepertuis,
- **allaitement.**
- Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

Attention

Ce médicament peut provoquer des éruptions cutanées parfois graves. Ces éruptions sont plus fréquentes en cas de posologie initiale trop élevée ou d'augmentation trop rapide des doses.

L'association (fréquente) de ce médicament à d'autres antiépileptiques peut augmenter sa concentration dans le sang et constitue un facteur de risque supplémentaire. Il est indispensable de respecter scrupuleusement la posologie prescrite.

Si malgré ces précautions, une éruption cutanée survient sans cause évidente (varicelle, moustiques, orties...), consultez immédiatement un médecin. De même, la survenue d'une conjonctivite, d'un gonflement du visage ou d'une fièvre inexplicable peut nécessiter un avis médical rapide.

Des précautions sont nécessaires chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique ou ayant présenté une éruption de boutons lors de la prise d'un autre antiépileptique.

Signalez à votre médecin d'éventuels antécédents de réaction allergique aux médicaments.

Ne modifiez ni n'interrompez jamais votre traitement sans l'accord de votre médecin : risque de réapparition des convulsions, même si aucune crise n'est survenue depuis une longue période. L'arrêt du traitement doit être progressif par diminution de la posologie sur une durée de 15 jours.

 La conduite automobile et l'utilisation de machines dangereuses sont contre-indiquées chez les épileptiques lorsque les crises persistent malgré un traitement préventif. Par ailleurs, ce

médicament peut être à l'origine de vertiges ou de troubles visuels.

Interactions du médicament LAMITOR® avec d'autres substances

Ce médicament ne doit pas être associé au millepertuis : risque de diminution de sa concentration dans le sang et de son efficacité.

Il peut interagir avec le valproate de sodium et les autres antiépileptiques : le médecin en tient compte dans sa prescription. Ne modifiez jamais votre traitement sans avis médical.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

Si une grossesse survient pendant le traitement, consultez votre médecin : l'arrêt brutal du traitement exposerait à la réapparition de crises préjudiciables à la mère et à l'enfant à naître.

Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait maternel. L'allaitement est contre-indiqué pendant le traitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament LAMITOR®

Les comprimés dispersibles LAMITOR® 5 mg peuvent être avalés tels quels, croqués ou dissous dans un peu d'eau (pour l'enfant de moins de 6 ans, ils doivent être dissous). Ils peuvent être pris indifféremment au cours ou en dehors des repas.

Posologie usuelle :

La posologie est variable d'un sujet à l'autre. Elle ne dépend pas de la gravité des troubles mais de la réaction de chacun.

Seul le médecin peut la définir.

Mode d'administration : voie orale.

Conseils

Les traitements antiépileptiques doivent être pris de manière régulière, sans interruption. L'oubli du traitement peut favoriser la survenue de nouvelles crises. Pour éviter les oublis, il est recommandé de prendre ce médicament à heure fixe. Un pilulier peut s'avérer utile. Veillez également à disposer d'une réserve de médicament ; lors de déplacements, munissez-vous d'une ordonnance en cours de validité.

Effets indésirables possibles du médicament LAMITOR®

Réactions allergiques ; les plus fréquentes sont des éruptions de boutons, le plus souvent bénignes, mais pouvant évoluer vers des lésions graves et exceptionnellement mortelles. La fréquence des réactions cutanées ayant conduit à une hospitalisation est de l'ordre de 1/1000 chez l'adulte et de 1/200 chez l'enfant.

Maux de tête, vertiges, troubles de la vision, tremblements, somnolence, agitation, fatigue, troubles digestifs, augmentation paradoxale de la fréquence des crises d'épilepsie.