

TYLENOL[®]

Antalgique et antipyrétique

Dans quel cas le médicament TYLENOL[®] est-il prescrit ?

Ce médicament est un antalgique et un antipyrétique qui contient du paracétamol.

Il est utilisé pour faire baisser la fièvre et dans le traitement des affections douloureuses.

Présentations du médicament TYLENOL[®]

TYLENOL[®] enfant : solution buvable; flacon de 125 ml

TYLENOL[®] 500 mg : comprimés sécables ; boîte de 20

TYLENOL[®] 500 mg : comprimés sécables ; boîte de 100

Composition du médicament TYLENOL[®]

	p 5 ml	p cp
Paracétamol	150 mg	500 mg

Contre-indications du médicament TYLENOL[®]

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- maladie grave du foie,
- Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

Attention

Le paracétamol est présent seul ou en association avec d'autres substances dans de nombreux médicaments : assurez-vous de ne pas prendre simultanément plusieurs médicaments contenant du paracétamol, car une prise conjointe entraîne un risque de surdosage qui peut être toxique pour le foie.

Interactions du médicament TYLENOL[®] avec d'autres substances

En cas de traitement par un *anticoagulant* oral et par du paracétamol aux doses maximales (4 g par jour) pendant au moins 4 jours, une surveillance accrue du traitement *anticoagulant* sera éventuellement nécessaire.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

Les études scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation du paracétamol chez la femme enceinte.

Allaitement :

Aux doses usuelles, l'usage de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament TYLENOL[®]

Ce médicament peut être pris indifféremment pendant ou entre les repas, en respectant un intervalle de 4 à 6 heures entre 2 prises. En cas d'*insuffisance rénale*, l'intervalle entre 2 prises doit être au minimum de 8 heures.

Solution buvable pédiatrique :

Les prises doivent être espacées de 6 heures.

Comprimés :

Les comprimés sont destinés à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 27 kg.

Posologie usuelle :

- Adulte : 500 mg à 1 g, 1 à 3 fois par jour. Ne pas dépasser 3 g de paracétamol par jour sans avis médical.

Dans les douleurs sévères de l'adulte et notamment dans l'arthrose, la posologie maximale peut être portée à 1 g de paracétamol, 4 fois par jour, uniquement sur prescription médicale.

- Enfant : 60 mg par kg et par jour, soit 15 mg par kg toutes les 6 heures, ou 10 mg par kg toutes les 4 heures. Il est nécessaire de choisir une présentation adaptée et de suivre les recommandations de votre pharmacien ou de votre médecin.
- La dose quotidienne maximale de paracétamol chez l'enfant est de 80 mg par kg, en 4 prises minimum, sans dépasser 3 g par jour.

Conseils

Dans le traitement de la fièvre chez l'enfant, lorsque le paracétamol est utilisé à la dose de 60 mg par kg et par jour, l'adjonction d'aspirine ou son usage en alternance avec le paracétamol est inutile, car l'aspirine ne permet pas d'obtenir une baisse supplémentaire de la fièvre.

Des sueurs abondantes accompagnent généralement la baisse de température lors du traitement des fièvres élevées. Ce phénomène est normal.

Effets indésirables possibles du médicament TYLENOL[®]

Exceptionnellement : réaction allergique cutanée.