

SOWEL®

Mis à jour : Jeudi, 20 Janvier 2011.

Antiparkinsonien

Dans quel cas le médicament SOWEL®

est-il prescrit ?

Ce médicament est un antiparkinsonien qui appartient à la famille des anticholinergiques (atropiniques).

Il est utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens induits par les neuroleptiques.

Présentations du médicament SOWEL®

SOWEL® 2 mg : comprimé; boîte de 20

SOWEL® 5 mg : comprimé; boîte de 20

Composition du médicament SOWEL®

	p cp	p cp
Trihexyphénidyle chlorhydrate	2 mg	5 mg

Contre-indications du médicament SOWEL®

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- risque de glaucome à angle fermé,
- risque de rétention des urines (adénome de la prostate),
- maladie cardiaque grave.
- Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

Attention

Ce médicament présente des effets atropiniques. Il peut provoquer un glaucome aigu chez les personnes prédisposées : œil rouge, dur et douloureux, avec vision floue. Une consultation d'extrême urgence auprès d'un ophtalmologiste est nécessaire.

Vous ne devez pas interrompre brutalement ce traitement.

Des précautions sont nécessaires en cas d'antécédent de constipation grave ou de rétention urinaire et chez la personne âgée.

 Conducteur : ce médicament peut être responsable de troubles visuels et d'une sensibilité anormale à la lumière.

Interactions du médicament SOWEL® avec d'autres substances

Informez votre médecin si vous prenez un autre médicament atropinique ou un médicament contenant du lisuride.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse et nouveau-né :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

Si le traitement est poursuivi jusqu'à l'accouchement, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire.

Allaitement :

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament SOWEL®

La dose quotidienne est répartie en 2 ou 3 prises.

Posologie usuelle :

La posologie est variable d'un sujet à l'autre. Elle ne dépend pas de la gravité des troubles mais de la réaction de chacun. Seul le médecin peut la définir.
Mode d'administration : voie orale.

Effets indésirables possibles du médicament SOWEL®

Effets atropiniques : troubles de l'accommodation, sécheresse de la bouche, constipation, difficultés à uriner.

Ces effets sont plus fréquents chez la personne âgée et peuvent s'accompagner d'une confusion des idées.

Éruption cutanée, infection des glandes salivaires, dilatation du côlon.